

Triage septického šoku u dětí (podle American Academy of Pediatrics)

U pacienta je podezření na infekci a/nebo je přítomna teplotní abnormalita trvající > 4 h

Ne

Pacient je vyřazen z triage septického šoku

Ano

Pokračuj dále v hodnocení stavu podle triage septického šoku

Podrobné vyšetření: je pacient kriticky nemocný ?

Ano

Okamžitý překlád na JIRP, aktivace pracoviště JIRP

Ne

Pokračování v triage septického šoku

- Zjištění vitální funkcí
- Zjištění stručné anamnézy a vyšetření stavu vědomí, nálezu na kůži, času kapilárního návratu
- Patří pacient do rizikové skupiny? (Viz tab. 1)

Zjištění příznaků septického šoku (tab 2)

- teplotní abnormality°C
- hypotenze.....mmHg
- tachykardie.....bpm
- čas kapilárního návratu (tab 3).....s
- stav chování, vědomí (tab 3)
- kožní nález (tab 3).....



Je pacient v hypotenzi?

Ano

Postup podle protokolu léčby septického šoku. Aktivace pracoviště JIRP

Ne

Má pacient ≥ 3 z 8 klinických příznaků
Nebo má rizikový pacient ≥ 2 z 8 klinických příznaků?

Ne

Pokračuj v rutinní péči

Ano

Pacient podle triage septického šoku splňuje kritéria septického šoku je odeslán na JIRP



Intenzivista je v soulase s předchozím postupem

Ano

Ne

Pokračuj v rutinní péči

Tab.1 Rizikové skupiny pacientů

- Malignita
- Asplenie
- St.p. transplantaci kostní dřeně
- Centrální žilní katétr, nebo jiný katétr
- St.p. orgánové transplantaci
- Závažná mentální retardace nebo DMO
- Imunodeficiencie, imunosuprese

Tab. 2 Hodnoty vitálních funkcí (podle PALS)

Věk	AS	DF	Tk _{sys.} (torr)	T°C
0 d - 1m	>205	>60	<60	<36 nebo>38
1 m – 3 m	>205	>60	< 70	<36 nebo>38
3 m - 1r	>190	>60	< 70	<36 nebo>38,5
1r.- 2r.	>190	>40	<70+(roky x 2)	<36 nebo>38,5
2r. - 4r.	>140	>40	<70+(roky x 2)	<36 nebo>38,5
4r. – 6r.	>140	>34	<70+(roky x 2)	<36 nebo>38,5
6r. – 10r.	>140	>30	<70+(roky x 2)	<36 nebo>38,5
10r. – 13r.	>100	>30	<90	<36 nebo>38,5
>13	>100	>30	<90	<36 nebo>38,5

Tab. 3 Abnormální nálezy

	Studený šok	Teplý šok	Nespecifické příznaky
pulzy	Oslabený až vymizelý	Mrštný puls	
Kapilární návrat	>3s	<1s	
Kůže	Chladná, mramorovaná	Teplá, červená	Petechie, purpura
Stav vědomí			Snížený stupeň vědomí Dráždivost Zmatenost Neadekváttní křik Porucha komunikace s rodiči Lethargie